暫時碼

06A00713

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1. 種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2. 種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 □(6)暗綠 □(7)褐 ■(8)黑
3. 千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1. 上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2. 下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 ■(2)中 □(3)高
3. 分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 ■(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3. 葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4. 葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1. 花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2. 花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1. 著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2. 每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6. 每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4. 其他需要補充之性狀：



吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 ■(3)菱形 □(4)圓卵形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00715

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
　1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
　2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
　　　　　　　□(6)暗綠 □(7)褐 ■(8)黑
　3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
　1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
　2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
　1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
　2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
　3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
　1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
　2. 小葉形狀：□(1)披針形■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
　　　　　　　□(5)橢圓形
　3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
　4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
　1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
　2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
　1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 □(3)頂部
　2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
　3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
　　　　　　　　□(5)14粒以上 (5莢平均)
　4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
　5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
　6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
　1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
　2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
　3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
　4.其他需要補充之性狀：

06A00724

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 □(2)綠及紫 ■(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：□(1)黃 ■(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 □(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 □(2)中 ■(3)高

七、其他
1. 抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00725

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 ■(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 □(2)中 ■(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 ■(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：■(1)淺綠 □(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：□(1)黃 ■(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00727

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 ■(2)中 □(3)高
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：□(1)黃 ■2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00733

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00735

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00736

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 □(7)褐 ■(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 □(3)2～3 ■(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 □(4)暗褐 ■(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 □ (2)中 ■(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00738

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
　1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
　2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
　　　　　　　□(6)暗綠 ■(7)暗褐 □(8)黑
　3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
　1.上胚軸色澤：□ (1)綠 ■ (2)紫
　2.下胚軸色澤：■ (1)綠 □(2)紫

三、莖
　1. 主莖節數： □ (1)少 □(2)中 ■(3)多
　2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)
　3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
　1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 □(3)2～3 ■(4)3～4
　2. 小葉形狀：■(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
　　　　　　　□(5)橢圓形
　3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
　4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
　1.花朵旗瓣顏色： □(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
　2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
　1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
　2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
　3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
　　　　　　　　□(5)14粒以上 (5莢平均)
　4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
　5.播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
　6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
　1. 抗病性：□(1)強 □ (2)中 ■(3)弱
　2. 抗蟲性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
　3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
　4.其他需要補充之性狀：

吉豆 (Black Gram)

06A00743

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□(1)粉質 ■ (2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 ■(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重： ■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■ (2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少□(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色： □(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 □ (2)中 ■(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00744

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□ (1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 □(6)暗綠 ■(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重： ■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少□(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 □(3)2～3 ■(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色： □(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：■(1)強 □ (2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■ (2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00745

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□ (1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 ■(7)黃褐 □(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 □(3)2～3 ■(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□ (1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色： □(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性： □(1)強■ (2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■ (2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00746

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □ (2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 ■(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少□(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■ (2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □ (4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□ (1)綠 □(2)綠及紫■(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 □(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 □(4)暗褐 ■(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 □(2)中 ■(3)高

七、其他
1. 抗病性： □(1)強■ (2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■ (2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：



06A00747



吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少■ (2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 ■(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)＜1 ■ (2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫□(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色： □(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 □(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 ■(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□ (1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 □(4)暗褐 ■(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■ (2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性： ■(1)強 □(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
3株型： □(1)有限型 ■ (2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00754

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□ (1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 □(6)暗綠 □(7)褐 ■(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少□(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 ■(3)菱形 □(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫□(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■ (2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■ (2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性： □(1)強 □(2)中■(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■ (2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00763



吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 ■(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重： □(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □ (2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■ (2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 □(2)中 ■(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 □ (2)中 ■(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■ (2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00773

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 □(3)2～3 ■(4)3～4
2. 小葉形狀：■(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：■(1)淺綠 □(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 □(2)綠及紫 ■(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00774

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 □(3)2～3 ■(4)3～4
2. 小葉形狀：■(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：■(1)淺綠 □(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 □(2)綠及紫 ■(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：



06A00801

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 □(6)暗綠 ■(7)暗褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高（成熟期）：■(1)低 □(2)中 □(3)
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 ■(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 ■(3)菱形 □(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 □(2)綠 ■(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：□(1)黃 ■(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 □(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3.每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 □(2)中■(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

06A00802

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 ■(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：■ (1)＜1 □(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：■(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■ (1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

06A00803

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□(1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □ (4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00835

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□(1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)＜1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □ (4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：□(1)黃 ■(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 □(2)中 ■(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00836

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
 1.種皮光澤：□(1)粉質 ■(2)油亮
 2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
 ■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
 3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
 1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
 2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
 1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
 2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
 3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
 1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □ (4)3～4
 2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
 □(5)橢圓形
 3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
 4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
 1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
 2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
 1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
 2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
 3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
 □(5)14粒以上（5莢平均）
 4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
 5.播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
 6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
 1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
 2. 抗蟲性：□(1)強 ■□(2)中 □(3)弱
 3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
 4.其他需要補充之性狀：



暫時碼

06A00843

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 ■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 ■(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 ■(3)菱形 □(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 □(2)綠 ■(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

06A00844

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□(1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 ■(5)綠
□(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 ■(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 □(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少□(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 ■(2)黃 □(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 □(2)中 ■(3)高

七、其他
1. 抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：



暫時碼

06A00847

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)＜1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □ (4)3～4
2. 小葉形狀：■(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色： □(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 □(2)中 ■(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中□(3)弱
2. 抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：



06A00860

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 □(7)褐 ■(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 ■(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 ■(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：□(1)有限型 ■(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：



暫時碼

06A00861

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□(1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 ■(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 ■(2)中 □(3)高
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：■(1)<1 □(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 ■(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高（註明：5株平均　　公克）

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：



暫時碼

06A00870

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 ■(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：■(1)<1 □(2)1~2 □(3)2~3 □(4)3~4
2. 小葉形狀：□(1)披針形■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6~8 □(3)9~11 □(4)12~14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00891

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□(1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 ■(5)綠
□(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：■(1)<1 □(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 (3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00897

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高（成熟期）：■(1)低 □(2)中 □(3)
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：□(1)黃 ■(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部■(2)中部 □(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：
(1)開花結果期早。
(2)生長期快速。

暫時碼

06A00898

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 ■(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：



暫時碼

06A00902

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子

1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 ■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉

1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖

1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片

1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □ (4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花

1.花朵旗瓣顏色： □(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果

1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 □(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他

1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：



農業試驗所作物種原組中期庫
吉豆與爪哇大豆種子發芽率

作物別	暫時碼	播種試驗平均發芽率(%)
吉豆(BLACK GRAM)	05A01696	100
吉豆(BLACK GRAM)	05A01717	100
吉豆(BLACK GRAM)	05A01729	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00680	95.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00688	87.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00689	70
吉豆(BLACK GRAM)	06A00693	77.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00701	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00708	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00712	94.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00713	64.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00714	82.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00715	88
吉豆(BLACK GRAM)	06A00724	80
吉豆(BLACK GRAM)	06A00725	64
吉豆(BLACK GRAM)	06A00727	62
吉豆(BLACK GRAM)	06A00733	44
吉豆(BLACK GRAM)	06A00735	87
吉豆(BLACK GRAM)	06A00736	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00738	77.7
吉豆(BLACK GRAM)	06A00743	75.3
吉豆(BLACK GRAM)	06A00744	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00745	87.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00746	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00747	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00754	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00763	96
吉豆(BLACK GRAM)	06A00773	88
吉豆(BLACK GRAM)	06A00774	71
吉豆(BLACK GRAM)	06A00801	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00802	90
吉豆(BLACK GRAM)	06A00803	90
吉豆(BLACK GRAM)	06A00835	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00836	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00843	98
吉豆(BLACK GRAM)	06A00844	82
吉豆(BLACK GRAM)	06A00847	95
吉豆(BLACK GRAM)	06A00860	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00861	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00870	64
吉豆(BLACK GRAM)	06A00891	30
吉豆(BLACK GRAM)	06A00897	40
吉豆(BLACK GRAM)	06A00898	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00902	100

爪哇大豆

農業試驗所作物種原組中期庫
吉豆與爪哇大豆種子發芽率

作物別	暫時碼	播種試驗平均發芽率(%)
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05215	26.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05216	29
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05217	50.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05218	47.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05219	57.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05220	41.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05221	14.2
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05222	8.3
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05223	31.3
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05224	52.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05225	75
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05226	10.6
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05227	32.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05228	43
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05229	45.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05230	46.9
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05231	57
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05232	50
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05233	65.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05234	9.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05235	45
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00121	28.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00122	43.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00123	18
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00124	28.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00125	23.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00126	52.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00127	5.2
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00128	11.1
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00129	20
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00130	23.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00131	46
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00132	43
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00133	25.2
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00134	33.5

吉豆性狀調查表填表說明
(參考綠豆品種性狀檢定表修訂)

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義		備考
1	千粒種子重	果莢成熟期測定	輕 中 重	少於或等於35克 35.1克至45克 多於或等於45.1克	
2	主莖節數	成熟期測定	少 中 多	低於或等於4.8節 4.9節至5.8節 高於或等於5.9節	五株平均
3	主莖高度	成熟期測定	低 中 高	低於或等於23公分 23.1公分至30公分 高於或等於30.1公分	五株平均
4	分枝數	成熟期測定	弱 中 強	少於或等於3.6支 3.7支至5.8支 多於或等於5.9支	五株平均
5	每株莢數	成熟期測定	少 中 多	少於或等於5莢 5.1莢至9莢 多於或等於9.1莢	五株平均
6	播種至50%豆莢成熟日數	成熟期測定	早 中 晚	少於或等於59天 60天至79天 多於或等於80天	五株平均
7	每株種子產量	成熟期測定	低 中 高	少於或等於1.2克 1.3克至2克 多於或等於2.1克	五株平均

爪哇大豆性狀調查表填表說明
(參照大豆品種性狀檢定表)

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義		備考
1 (*) (+)	株型	60或89觀察	參照圖1		
2 (*) (+)	下胚軸色澤	10觀察	參照圖2		
3 (*) (+)	主莖茸毛色澤	65開花期觀察	參照圖3		
4 (*) (+)	主莖茸毛多少	65開花期觀察	參照圖4		
5 (*) (+)	主莖茸毛形狀	65開花期觀察	參照圖5		
6 (*)	主莖高度	79綠莢成熟期或89成熟期測定	1 2 3 4 5 6 7 8 9	低於或等於30公分 30.1公分至40公分 40.1公分至50公分 50.1公分至60公分 60.1公分至70公分 70.1公分至80公分 80.1公分至90公分 90.1公分至100公分 高於100公分	
7	分枝數	79綠莢成熟期或89成熟期測定	1 3 5 7 9	少於或等於3.0支 3.1支至4.0支 4.1支至5.0支 5.1支至6.0支 多於6.0支	
8	主莖節數	79綠莢成熟期或89成熟期測定	1 3 5 7 9	少於或等於9.0節 9.1節至13.0節 13.1節至17.0節 17.1節至21.0節 多於 21.0節	

爪哇大豆性狀調查表填表說明
(參照大豆品種性狀檢定表)

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義			備考
9	結莢高度	79綠莢成熟期或 89成熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於12.0公分 12.1公分至14.0公分 14.1公分至16.0公分 16.1公分至18.0公分 高於18.0公分	
10	小葉數	65開花期觀察	參照圖6			
11	小葉形狀	65開花期觀察	參照圖7			
12	開花期	65開花期觀察	極早 早 中 晚 極晚	1 3 5 7 9	少於或等於25天 26天至32天 33天至39天 40天至45天 多於45天	
13	花色	65開花期觀察	參照圖8			
14	綠莢成熟期	79綠莢成熟期測定	極早 早 中 晚 極晚	1 3 5 7 9	少於或等於70天 71天至80天 81天至90天 91天至100天 多於100天	毛豆用
15	鮮莢色澤	79綠莢成熟期觀察	參照圖9			毛豆用
16	單株總莢數	79綠莢成熟期測定	極少 少 中 多 極多	1 3 5 7 9	少於或等於20.0莢 20.1莢至30.0莢 30.1莢至40.0莢 40.1莢至50.0莢 多於50.0莢	毛豆用
17	單株總莢重	79綠莢成熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於40.0公克 40.1公克至60.0公克 60.1公克至80.0公克 80.1公克至100.0公克 高於100.0公克	毛豆用
18	著莢密度	79綠莢成熟期 測定單株總莢數 ／主莖長度	極疏 疏 中 密 極密	1 3 5 7 9	低於或等於0.75 0.75至1.00 1.01至1.25 1.26至1.50 高於1.50	毛豆用

爪哇大豆性狀調查表填表說明
(參照大豆品種性狀檢定表)

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義			備考
19 (*)	合格莢大小	79綠莢成熟期測定二粒莢以上之百莢重	極小 小 中 大 極大	1 3 5 7 9	少於或等於295公克 296公克至325公克 326公克至355公克 356公克至385公克 高於385公克	毛豆用
20	合格莢率	79綠莢成熟期測定單株合格莢重/單株總莢重	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於60.0% 60.1%至70.0% 70.1%至80.0% 80.1%至90.0% 高於90.0%	毛豆用
21 (*)	≧三粒莢率	79綠莢成熟期測定三粒莢以上莢數/單株總莢數	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於10.0% 10.1%至20.0% 20.1%至30.0% 30.1%至40.0% 高於40.0%	毛豆用
22 (*)	二粒莢長	79綠莢成熟期測定	極短 短 中 長 極長	1 3 5 7 9	小於或等於4.0公分 4.1公分至4.5公分 4.6公分至5.0公分 5.1公分至5.5公分 大於5.5公分	毛豆用
23 (*)	二粒莢寬	79綠莢成熟期測定	極狹 狹 中 廣 極廣	1 3 5 7 9	小於或等於1.0公分 1.01公分至1.20公分 1.21公分至1.40公分 1.41公分至1.60公分 大於1.60公分	毛豆用
24	單莢粒數(單株粒數/單株莢數)	79綠莢成熟期測定	極少 少 中 多 極多	1 3 5 7 9	少於或等於1.50粒 1.51粒至1.80粒 1.81粒至2.10粒 2.11粒至2.40粒 多於2.40粒	毛豆用
25 (*)	剝實率(單株粒重/單株莢重)	79綠莢成熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於50.0% 50.1%至60.0% 60.1～70.0% 70.1～80.0% 高於80.0%	毛豆用
26 (*)	鮮籽粒大小	79綠莢成熟期測定飽滿鮮豆仁之百粒重	極小 小 中 大 極大	1 3 5 7 9	少於或等於70公克 71公克至80公克 81公克至90公克 91公克至100公克 高於100公克	毛豆用

爪哇大豆性狀調查表填表說明
(參照大豆品種性狀檢定表)

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義			備考
27 (*) (+)	鮮籽粒色澤	79綠莢成熟期觀察	參照圖10			毛豆用
28 (+)	殺菁後鮮豆莢色澤	79綠莢成熟期觀察	參照圖11			毛豆用
29	殺菁後鮮籽粒香氣	79綠莢成熟期測定	官能品評			毛豆用
30	殺菁後鮮籽粒甜味	79綠莢成熟期測定	官能品評			毛豆用
31 (*)	乾莢成熟期	89成熟期測定	極早 早 中 晚 極晚	1 3 5 7 9	少於或等於90天 91天至105天 106天至120天 121天至135天 多於135天	
32 (*) (+)	乾莢色澤	89成熟期觀察	參照圖12			
33 (+)	裂莢性	89成熟期觀察	參照圖13			
34 (*)	種子大小	99枯熟期測定種子的百粒重	極小 小 中 大 極大	1 2 3 4 5 6 7 8 9	少於或等於10.0公克 10.1公克至15.0公克 15.1公克至20.0公克 20.1公克至25.0公克 25.1公克至30.0公克 30.1公克至35.0公克 35.1公克至40.0公克 40.1公克至50.0公克 高於50.0公克	
35 (*)	種子形狀	99枯熟期測定種子長、寬、厚	圓 扁圓 橢圓 扁橢圓	1 2 3 4	寬／長；厚／寬 大於或等於0.85；大於或等於0.85 大於或等於0.85；小於0.85 小於0.85；大於或等於0.85 小於0.85；小於0.85	
36 (*) (+)	種子色澤	99枯熟期觀察	參照圖14			
37 (*) (+)	種臍色澤	99枯熟期觀察	參照圖15			

爪哇大豆性狀調查表填表說明
(參照大豆品種性狀檢定表)

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義			備考
38 (*) (+)	子葉色澤	99枯熟期觀察	參照圖16			
39 (+)	種子光澤	99枯熟期觀察	參照圖17			
40 (+)	種皮裂皮性	99枯熟期觀察	參照圖18			
41	粗蛋白含有率	99枯熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於36.0% 36.1%至40.0% 40.1%至44.0% 44.1%至48.0% 高於48.0%	
42	粗脂肪含有率	99枯熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於15.0% 15.1%至19.0% 19.1%至22.0% 22.1%至26.0% 高於26.0%	
43	適栽期	79綠莢成熟期或89成熟期觀察	指檢定地區的最適播種期。			
44	倒伏抗性	79綠莢成熟期或89成熟期觀察主莖傾斜角度	極弱 弱 中 強 極強	1 3 5 7 9	大於60度 41度至60度 21度至40度 11度至20度 小於或等於10度	

註：“*”表示性狀檢定必須調查之項目。
“+”表示此性狀有圖示。
“x”調查時期參照表1。

圖1　株型（性狀1）

有限生長型

半無限生長型

無限生長型

圖2　幼莖胚軸色澤（性狀2）

綠色

紫色

圖3　植株茸毛色澤（性狀3）

無

白色

褐色

圖4　植株茸毛多少（性狀4）

無　　疏　　密

圖5　植株茸毛形狀（性狀5）

無　　直　　扁

圖6　小葉數目（性狀10）

3葉　　5葉　　7葉

圖7　小葉形狀（性狀11）

1.披針形 lanceolate　　2.菱形 diamond　　3.銳卵形 pointed ovate　　4.卵圓形 rounded ovate

圖8　花色（性狀13）

白色　紫色

圖9　鮮莢色澤（性狀15）

淡綠　綠　濃綠

圖10　鮮籽粒色澤（性狀27）

淡綠　綠　濃綠　紫綠

圖11　殺菁後鮮莢色澤（性狀28）

淡綠　綠　濃綠

圖12　乾莢色澤（性狀32）

淡褐　褐　暗褐

圖13　裂莢性（性狀33）

易　難

圖14　種子色澤（性狀36）



黃白　黃　黃綠　綠



淡褐　褐　暗褐　黑

複色

圖15　種臍色澤（性狀37）

黃　　綠



淡褐　　褐　　暗褐

黑　　黑　　灰

圖16　子葉色澤（性狀38）

黃　　綠

圖17　種皮光澤（性狀39）

強　弱　強　弱

圖18　裂皮性（性狀40）

易　中　難

吉豆與爪哇大豆種原圖說

Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations

編 著 者:蕭翌柱 Yih-Juh Shiau 、黃倉海 Chang-Hai Huang

發 行 人:陳駿季 Junne-Jih Chen

出 版 者:行政院農業委員會農業試驗所

Taiwan Agricultural Research Institue , Council of Agriculture , Executive Yuan

地　　址:台中市霧峰區萬豐里中正路189號

No.189,Zhongzheng Rd.,Wufeng Dist.,Taichung City 41362,Taiwan(R.O.C.)

電話:(04)2330-2301

傳真:(04)2333-8162

網　　址:http://www.tari.gov.tw

出版年月:2016年12月

定　　價:200元

系 統 號:4510-5030-48

ISBN:9789-8605-1515-2

展 售 處:GPK政府出版品知識庫http://www.govbooks.com.tw/GPK

電子書設機製作

設計製作:峰林實業有限公司

地　　址:臺中市西屯區長安路二段101號

電　　話:(04)22967677

電子郵件:Ching.kai@msa.hinet.net

電子書播放資訊

作業系統:Windows,Mac

檔案格式:Adobe PDF

檔案內容:2D

播放軟體:PDF Reader

使用載具:PC